



## Практичні навички на державний іспит, практична частина

### Спеціальність «Акушерська справа»

#### Предмет «Акушерство»

2016-17 н. р.

Викладач: Дрегалюк В.С.

1. Продемонструйте зовнішній огляд вагітної.
2. Продемонструйте огляд шийки матки за допомогою піхвового дзеркала.
3. Продемонструйте бімануальне піхвове дослідження.
4. Продемонструйте вислуховування серцебиття плода.
5. Продемонструйте вимірювання обводу живота, висоти стояння дна матки.
6. Продемонструйте проведення зовнішнього акушерського дослідження (четири прийоми).
7. Продемонструйте зовнішнє акушерське дослідження за допомогою прийомів Леопольда-Левицького.
8. Продемонструйте взяття матеріалу для визначення ступеня чистоти піхви.
9. Продемонструйте якісне визначення білка в сечі.
10. Продемонструйте визначення передбачуваної дати пологів.
11. Продемонструйте вимірювання зовнішніх розмірів таза.
12. Продемонструйте вимірювання ромба Міхаеліса.
13. Продемонструйте вимірювання діагональної кон'югати.
14. Продемонструйте визначення справжньої кон'югати різними способами.
15. Продемонструйте визначення істинної кон'югати за величиною зовнішньої кон'югати.
16. Продемонструйте визначення істинної кон'югати за величиною діагональної кон'югати.
17. Продемонструйте вимірювання індексу Соловйова.
18. Продемонструйте вимірювання розмірів площини виходу з малого таза.
19. Продемонструйте визначення ознаки Вастена.
20. Визначення відношення голівки плода до входу в таз під час зовнішнього дослідження.
21. Продемонструйте оцінювання зріlosti шийки матки за Бішопом.
22. Продемонструйте підготовку шийки матки до індукції пологів.
23. Продемонструйте на фантомі акушерську ручну допомогу при головному передлежанні.
24. Продемонструйте визначення ознаки Альфельда.
25. Підготуйте набір медичних інструментів для ведення пологів.
26. Продемонструйте приймання пологів при головному передлежанні.
27. Продемонструйте первинний туалет новонародженого, обробка пуповини.
28. Продемонструйте відсмоктування слизу в новонароджених.
29. Продемонструйте визначення крововтрати в послідовий і ранній післяпологовий періоди.
30. Продемонструйте огляд посліду на цілісність.
31. Продемонструйте огляд пологових шляхів.
32. Проведення профілактики кровотечі в III період пологів.
33. Продемонструйте активне ведення III періоду пологів.
34. Продемонструйте зовнішній масаж матки.
35. Продемонструйте тимчасовий метод зупинки маткової кровотечі.
36. Продемонструйте зовнішній спосіб виділення плаценти. (Креде-Лазаревича).
37. Продемонструйте зовнішній спосіб виділення плаценти. (Абуладзе).
38. Продемонструйте на фантомі техніку ручного відокремлення посліду.
39. Продемонструйте ревізію стінок порожнини матки.
40. Продемонструйте проведення методів зупинки кровотечі в ранній післяпологовий період.
41. Підберіть медичний набір інструментів для проведення штучного аборту.
42. Підготовка медичних інструментів та проведення епізіотомії.
43. Підготовка медичних інструментів та виконання амніотомії (на фантомі).
44. Підготовка медичних інструментів та виконання епізіотомії та перинеотомії (на фантомі).
45. Підготовка медичних інструментів та накладання швів на промежину у разі розриву I-II ступеня.
46. Продемонструйте накладання швів на розриви шийки матки.
47. Продемонструйте зняття швів з шкіри промежини.
48. Продемонструйте допомогу за Цов'яновим при чистому сідничному передлежанні.

49. Продемонструйте на фантомі техніку класичної ручної допомоги при тазовому передлежанні.
50. Продемонструйте непрямий масаж серця новонародженному.
51. Надання невідкладної медичної допомоги при прееклампсії III ступеня важкості.
52. Надання невідкладної медичної допомоги при нападі еклампсії.
53. Надання невідкладної медичної допомоги новонародженному (відсмоктування слизу).
54. Продемонструйте невідкладну медичну допомогу новонародженному в пологовому залі (штучна вентиляція легень).

#### Запитання з техніки безпеки в акушерстві на державний іспит, практична частина

1. Назвіть універсальні заходи безпеки акушерки пологового відділення.
2. Назвіть індивідуальні засоби захисту акушерки пологового залу.
3. Які вимоги до одягу медперсоналу при догляді за пацієнтками в палаті для госпіталізації вагітних, роділь і породіль з інфекційними захворюваннями в стадії гострих клінічних проявів?
4. Які особливості догляду за пацієнтками в палаті для госпіталізації вагітних, роділь і породіль з інфекційними захворюваннями в стадії гострих клінічних проявів?
5. Назвіть специфічні професійні шкідливі чинники акушерки пологового відділення.
6. Назвіть особливості скринінгу медичного персоналу акушерського стаціонару на наявність захворювань.
7. Назвіть особливості використання індивідуальних засобів захисту при наданні акушерської ручної допомоги ВІЛ-інфікованій роділлі.
8. Опишіть підготовку акушерки перед прийманням пологів.
9. Опишіть порядок збору та транспортування використаної білизни.
10. Назвіть заходи безпеки медичних працівників щодо зараження вірусними гепатитами В, С в акушерстві.
11. Назвіть заходи проти гепатиту В при контакті неімунізованого медичного працівника із біологічними рідинами потенційного джерела зараження.
12. Назвіть терміни проведення обстеження працівника на наявність антитіл до ВІЛ після аварії при роботі із ВІЛ-інфікованим матеріалом.
13. Якими наказами МОЗ України керується акушерка при роботі із ВІЛ-інфікованими та ВІЛ-інфікованим матеріалом?
14. Назвіть особливості реєстрації аварії при наданні медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та роботі з ВІЛ-інфікованим матеріалом.
15. Які правила експлуатації електричних пристрій у пологовому залі (електровідсмоктувач, джерело променевого тепла та ін.)?
16. Опишіть методику утилізації забрудненої кров'ю білизни після пологів.
17. Назвіть заходи безпеки при роботі з сухожаровою шафою.
18. Назвіть заходи безпеки при роботі з джерелом відкритого вогню (спиртівкою).
19. Назвіть заходи безпеки при роботі з гострим та ріжучим інструментарієм в акушерстві.
20. Назвіть заходи безпеки під час проведення передстерилізаційної підготовки інструментарію.
21. Назвіть заходи безпеки при виконанні акушерських операцій (відновлення цілісності пологових шляхів, зняття швів зі шкіри промежини).
22. Назвіть заходи безпеки при наданні допомоги породіллі із матковою кровотечою.
23. Назвіть відповідальних осіб за наявність умов і здійснення заходів щодо охорони здоров'я медичного персоналу.
24. Опишіть особливості проведення інструктажу з питань профілактики ВІЛ у медперсоналу та питань безпеки праці.
25. Назвіть правила використання медичних рукавичок.
26. Назвіть показання до використання стерильних рукавичок в акушерстві.
27. Назвіть показання до використання нестерильних рукавичок в акушерстві.
28. Під час виконання амніотомії навколооплідні води потрапили вам на слизову ока. Із обмінної карти пацієнтки: двократне тестування на ВІЛ - негативне. Ваші подальші дії.
29. Під час надання акушерської ручної допомоги навколооплідні води потрапили вам на слизову ока. Із обмінної карти пацієнтки: двократне тестування на ВІЛ - негативне. Ваші подальші дії.
30. Після проведення ручного відшарування та видалення плаценти медичний працівник виявив забруднення шкіри передпліччя кров'ю. Із обмінної карти пацієнтки: двократне тестування на ВІЛ - негативне. Які подальші дії медпрацівника?

31. Під час внутрішньом'язового введення седуксену вагітній із екламптичним статусом використаною голкою ви вкололи руку. Із обмінної карти пацієнтки: двократне тестування на ВІЛ - позитивне. Ваші подальші дії.

32. Під час виконання амніотомії навколо плідні води потрапили вам на слизову ока. Із обмінної карти пацієнтки: двократне тестування на ВІЛ - позитивне. Ваші подальші дії.

33. Під час надання акушерської ручної допомоги навколо плідні води потрапили вам на слизову ока. Із обмінної карти пацієнтки: двократне тестування на ВІЛ - позитивне. Ваші подальші дії.

34. Після проведення ручного відшарування та видалення плаценти медичний працівник виявив забруднення шкіри передпліччя кров'ю. Із обмінної карти пацієнтки: двократне тестування на ВІЛ - позитивне. Які подальші дії медпрацівника?

35. Під час внутрішньом'язового введення седуксену вагітній із екламптичним статусом використаною голкою ви вкололи руку. Із обмінної карти пацієнтки: двократне тестування на ВІЛ - негативне. Ваші подальші дії.

#### Типові задачі на державний іспит, практична частина

#### Спеціальність «Акушерська справа»

#### Предмет «Акушерство»

##### Задача 1.

Роділля 22 роки. Пологи I на 39-40 тиж вагітності. Розміри таза 27-28-30-17. Діагональна кон'югата 10 см. Індекс Соловйова 15 см. Перейми тривають 7 год. Навколо плідні води відійшли 1 год тому.

Скарги на біль понизу живота, болючі, сильні перейми, які йдуть одна за одною.

Контракційне кільце розташоване косо, на 5 п/п вище лона. Положення плода поздовжнє, спинка справа, дрібні частини плода не пропальповуються. Передлежить голівка малим сегментом в площині входу в малий таз. Серцебиття плода ритмічне, приглушене, до 120 уд/хв.

Шийка матки згладжена, відкриття 8 см. Плідний міхур відсутній. Передлежить голівка малим сегментом в площині входу в малий таз.

Попередній діагноз. Ваша тактика. Невідкладна допомога.

##### Задача 2.

Третя доба післяполового періоду.

Скарги на переймоподібний біль внизу живота та печію в ділянці швів.

Об'єктивно. Загальний стан задовільний. Температура тіла 37,5°C. Пульс - 96 уд/хв. АТ 110/80 мм рт ст. Живіт м'який, неболючий. Симптоми подразнення очеревини негативні. Перистальтика кишечника вислуховується. Висота стояння дна матки на 1 п/п нижче пупка, матка щільна із чіткими контурами.

Лохії буровато-мутні з неприємним запахом у помірній кількості.

Епізіотомна рана покрита брудно-сірим нашаруванням, тканини навколо гіперемійовані, набряклі. Ваш попередній діагноз. Акушерська тактика.

##### Задача 3.

Першовагітна 23 роки. Вагітність 39-40 тиж. Розміри таза 25-28-32-21. Діагональна кон'югата 11 см. Індекс Соловйова 15 см. Передбачувана маса плоду 2800 г. Перейми тривають протягом 5 год. Навколо плідні води не відходили.

Об'єктивно. Пологова діяльність активна, регулярна, перейми тривають по 40-45 сек. через 2-3 хв. Положення плода поздовжнє, передлежить голівка великим сегментом у вході в малий таз. Серцебиття плода 160 уд/хв.

Внутрішнє акушерське обстеження. Відкриття маткового вічка 8 см. Плодовий міхур цілий, плоский. Передлежить голівка. Стріловидний шов у правому косому розмірі. Мале тім'ячко зліва до переду. Міс досягається. Екзостозів немає.

Ваш попередній діагноз. Акушерська тактика.

##### Задача 4.

Роділля 36 років, доставлена машиною швидкої допомоги з дому. Зі слів родичів, вагітність п'ята, пологи п'ята. На обліку по вагітності в жіночій консультації не стояла. Три тижні тому з'явились набряки на кінцівках. Зранку з'явились перейми, перед викликом швидкої допомоги знепритомніла, були судоми. Об'єктивно: роділля без свідомості, АТ 190/120 мм рт.ст., положення плоду поздовжнє, тазове передлежання, сідниці в порожнині малого таза. Серцебиття плода приглушене — 110-100 уд. за хвилину. При вагінальному дослідженні: відкриття шийки матки повне, сідниці в широкій частині порожнині малого таза, плідний міхур відсутній.

Ваш попередній діагноз. Акушерська тактика.

### Задача 5.

У передпологовій платі знаходиться роділля із регулярною пологовою діяльністю. Загальний стан задовільний. Шкірні покриви блідо-рожеві. Пульс 76 уд/хв, АТ 120/70 мм рт ст. ЧДР – 16 за хв. Перейми по 40-45 секунд через 3-4 хвилини. Поздовжнє положення плода, головне передлежання, I позиція, задній вид.

Із обмінної карти: Вагітність II, 39-40 тижнів. Недостатність аортального клапана. НК 0 ст.

Ваш попередній діагноз. Акушерська тактика.

### Задача 6.

У приймальне відділення поступила першовагітна 29 років. Вагітність 41-42 тиж. Розміри таза 26-29-31-20. Перейми тривають протягом 3 год. Навколо плідні води не відходили.

Об'ективно. Живіт збільшений за рахунок вагітної матки. Перейми тривають по 30-35 сек. через 2-3 хв. Положення плода поздовжнє, передлежить голівка притиснута до входу в малий таз. Серцебиття плода 106 уд/хв., серцеві тони приглушенні.

Внутрішнє акушерське обстеження. Шийка матки розташована по центру. М'яка, довжиною 1 см, розкриття 4 см. Плодовий міхур цілий. Передлежить голівка. Стріловидний шов у поперечному розмірі. Мале тім'ячко зліва. Мис не досягається.

Ваш попередній діагноз. Ваша тактика.

### Задача 7.

У роділлі 33 років, термін вагітності 38-39 тижнів, у I періоді пологів з'явились скарги на біль у правій боковій ділянці матки, кров'янисті виділення зі статевих шляхів.

Об'ективно. Загальний стан середньої важкості. Шкірні покриви бліді, пульс 106 уд/хв, АТ 90/60 мм. рт. ст. Живіт збільшений за рахунок вагітної матки. Положення плода поздовжнє. Передлежить голівка. Пологова діяльність активна. Матка в паузах між переймами повністю не розслабляється. Пальпаторно відмічається локальна випуклість в ділянці правої стінки матки. Серцебиття плода приглушено, ритмічне до 100 уд/хв. Зі статевих шляхів виділяється темна кров у загальній кількості 200 мл.

Ваш попередній діагноз. Акушерська тактика.

### Задача 8.

Вагітна доставлена машиною швидкої допомоги на ношах. Вагітність третя в терміні 9 тижнів. Дві попередні вагітності перервані в зв'язку з важким раннім гестозом. Вагітна виснажена, шкірні покриви сухі, тургор шкіри значно знижений, з рота - запах ацетону, Блювання до 25-30 раз на добу, їжу абсолютно не сприймає. Втіата у вазі до 12 кг. Діурез значно знижений.

Ваш попередній діагноз. Акушерська тактика.

### Задача 9.

Першовагітна 20 років. Вагітність 36-37 тиж. Звернулась у жіночу консультацію із скаргами на головний біль та набряки, мерехтіння сітки перед очима.

Об'ективно. АТ 160/100 мм рт ст. на обох руках. Набряки нижніх кінцівок та передньої черевної стінки. Симптом обручки позитивний. При розмові виявлено закладеність носа. Температура тіла 36,5°C. Прибавка у вазі 2600 г за останній місяць. Матка в нормотонусі. Положення плода поздовжнє, передлежить голівка. Серцебиття плода 140 уд/хв.

Ваш попередній діагноз. Ваша тактика.

### Задача 10.

У передпологовій палаті знаходиться роділля із пізнім гестозом.

Об'ективно. Скарги на головний біль. Набряки на нижніх кінцівках, АТ 160/115 мм. рт. ст. Пологова діяльність активна, регулярна, перейми по 45-50 сек через 2-3 хвилини. Положення плода поздовжнє, передлежить голівка. Серцебиття плода ритмічне до 146 уд/хв, справа нижче пупка.

Внутрішнє акушерське дослідження. Піхва жінки, що народжувала. Шийка матки м'яка, по центру, згладжена, маткове вічко відкрите на 5 см. Плідний міхур цілий, під час перейми наливається. Виділення звичайні.

З'явилось дрібне посмикування мімічних м'язів обличчя, згодом тонічні судоми.

Ваш попередній діагноз. Ваша тактика.

### Задача 11.

У жіночу консультацію звернулась жінка зі скаргами на затримку менструації, нудоту та однократне блювання в ранкову пору.

В анамнезі: Артеріальна гіpertenzія II ст (помірна). АТ - 160/105 мм.рт.ст.

При бімануальному дослідженні. Матка дещо збільшена, асиметрична, нахиlena до переду, розмірами нагадує жіночий кулак. Ваш попередній діагноз. Ваша тактика.

### Задача 12.

Вагітна В., (вік 26 років) хворіє на ревматизм із дитинства, як наслідок - вада серця. Вагітність перша, термін - 10 тижнів. Із настанням вагітності стан здоров'я погіршився: посилилась задишка, з'явились набряки на нижніх кінцівках. Пульс - 86 ударів за 1 хвилину, ціаноз губ, систолічний і діастолічний шуми на верхівці серця. Печінка виступає з-під реберної дуги на 4 см.

Ваш попередній діагноз. Акушерська тактика.

### Задача 13.

У пологовому залі знаходиться роділля 25 років. Пологи I, термінові. Поздовжнє положення, головне передлежання. Розкриття шийки матки повне до перейм приєднуються потуги. Пологова діяльність регулярна активна.

Із даних обмінної карти: Вагітність I. Група крові 0 (I) Rh – (негативна). Титр анти-резус антитіл протягом останніх двох тижнів становив 1:16 (в анамнезі переливання резус-позитивної крові).

Діагноз. Тактика. Особливості ведення пологів та післяполового періоду у даної жінки.

### Задача 14.

На приймальне відділення поступила повторновагітна зі скаргами на не регулярний переймоподібний біль, який триває 4 години. За даними обмінної карти: Вагітність I, 39-40 тижнів. Хронічна герпетична інфекція.

При огляді зовнішніх статевих органів виявлено в ділянці вульви множинні везикули розміром 2-3 мм та виразки неправильної форми, вкриті жовтим нашаруванням.

При внутрішньому акушерському дослідження: шийка матки м'яка по периферії, довжиною 2 см, зовнішнє вічко цервікального каналу пропускає кінчик пальця.

Ваш попередній діагноз. Акушерська тактика.

### Задача 15.

Пацієнта. К., 21 р., звернулася до лікаря жіночої консультації зі скаргами на загальну слабість та затримку менструації на протязі 2 місяців та на появу пінистих видіlenь з неприємним запахом, відчуття свербежу та печіння в ділянці зовнішніх статевих органів і піхви.

При огляді зовнішніх статевих органів виявлено почервоніння, мацерацію, розчухи шкіри вульви, промежини, малих і великих статевих губ.

При огляді в дзеркалах – ціаноз піхви, піхвової частини шийки матки, пінисті виділення. Матка збільшена до розмірів жіночого кулака, розм'якшена, рухома, не болюча. Додатки з обох сторін без змін.

Ваш попередній діагноз. Акушерська тактика.

### Задача 16.

В пологах роділля 25 років. Перші пологи, води цілі, ОЖ-112, ВДМ-38, матка напружена, наявна флюктуація, плід рухомий. С/б приглушене, шийка розкрита на 4 см, плодовий міхур напружений, передлегла частина рухома, невеликих розмірів.

Ваш попередній діагноз. Акушерська тактика.

### Задача 17.

0 21 год. На приймальне відділення поступила першовагітна 18 років. Скарги на переймоподібний біль понизу живота з 19 год. Навколоплідні води не відходили. Із даних "Обмінної карти" - вагітність I, 36-37 тиж. помірне багатоводдя. Кольпіт.

Об'ективно: Температура тіла 36,5 С, пульс 90 уд/хв, АТ на обох руках 140/90 мм. рт. ст. Набряки нижніх кінцівок.

Матка витягнута у поперечному напрямку, голівка зліва, спинка обернена до верху. С/б плода 180 уд/хв, ритмічне, звучне, вислуховується зліва на рівні пупка.

Ваш попередній діагноз. Акушерська тактика.

### Задача 18.

На приймальне відділення поступила повторновагітна, 37-38 тиж, із скаргами часті болючі перейми, які тривають протягом останніх двох годин. Навколоплідні води відійшли 90 хв тому.

Об'ективно: матка витягнута у поперечному напрямі, контракційне кільце розташоване косо, вище лона на 5 п/п. Крупна частина плода округлої форми знаходиться справа, серцевіття плода не вислуховується.

Внутрішнє акушерське дослідження: у піхві визначається набрякла та ціанотична частина плода у якої пальці різної довжини, великий палець відводиться і рухливий.

Ваш попередній діагноз. Акушерська тактика.

### Задача 19.

На черговий прийом у жіночу консультацію звернулась повторновагітна, 36-37 тижнів. Розміри таза: 23-26-28-18.

Скарг на даний момент не має.

При об'ективному обстеженні: матка правильної форми. Первішим прийомом Леопольда-Левицького у дні матки визначається крупна частина плода округлої форми із чіткими межами. Спинка плода зліва, до переду. Справа - дрібні частини плода. При проведенні третього прийому визначається крупна передлегла частина плода, без чітких меж, не здатна до балотування. Серцебиття плода звучне, ритмічне до 136 уд/хв. Набряки відсутні.

Ваш попередній діагноз. Акушерська тактика.

### Задача 20.

Першовагітна 23 р. Вагітність 39-40 тиж. Розміри таза 23-26-29-18. Діагональна кон'югата 11,5 см. Індекс Соловйова 13,7 см. Передбачувана вага плоду 2800 г. Перейми тривають протягом 5 год.

Об'ективно. Пологова діяльність активна, регулярна, перейми тривають по 40-45 сек. через 2-3 хв. Положення плода поздовжнє, передлежить голівка великим сегментом у вході в малий таз. Серцебиття плода 140 уд/хв.

Внутрішнє акушерське обстеження. Відкриття маткового вічка 9 см. Плодовий міхур цілий, плоский. Передлежить голівка. Стріловидний шов у правому косому розмірі. Мале тім'ячко зліва до переду. Мис досягається.

Ваш попередній діагноз. Акушерська тактика.

### Задача 21.

Машиною швидкої допомоги на приймальне відділення доставлена роділля зі скаргами на часті, сильні потуги протягом останньої години. Навколоплідні води відійшли 30 хвилин тому.

Об'ективно. Матка витягнута у поздовжньому напрямі. Пологова діяльність регулярна, перейми тривають по 60-65 сек. через 1-1,5 хв. Положення плода поздовжнє, передлежить голівка. Дрібні частини плода зліва, допереду. Серцебиття плода звучне, ритмічне до 140 уд/хв.

Внутрішнє акушерське дослідження. Піхва жінки, що народжувала. Шийка матки згладжена, відкриття маткового вічка 5 см. Передлежить голівка. Стріловидний шов у правому косому розмірі, мале тім'ячко справа дозаду. Мис не досягається. Підтікають світлі навколоплідні води.

Ваш попередній діагноз. Акушерська тактика.

### Задача 22.

У роділлі через 15 хвилин після народження хлопчика вагою 4100 гр. крововтратна в пологах становить 200 мл. При визначені ознак відшарування плаценти: пуповина при натисканні над лоном не втягується, затискач накладений на пуповину опустився на 11 см. Акушерка запропонувала роділлі потужитись - безрезультатно.

Ваш попередній діагноз. Акушерська тактика.

### Задача 23.

У роділлі із пізнім гестозом, у ранньому післяпологовому періоді виникла маткова кровотеча, яка становить 1200 мл.

Об'ективно: Загальний стан роділлі важкий, задишка, акроціаноз на фоні блідих шкірних покривів, холодний піт. Пульс 110 уд/хв слабкого наповнення та напруження, АТ 90/50 мм. рт. ст.

Через передню черевну стінку пальпуються м'яка матка, яка не реагує на зовнішній масаж та на в/в введення окситоцину.

Із пологових шляхів виділяється кров із згортками, які швидко руйнуються. Час згортання крові по Лі-Уайту 14 хвилин.

Ваш попередній діагноз. Акушерська тактика.

### Задача 24.

У роділлі із пізнім гестозом, у ранньому післяпологовому періоді виникла кровотеча, яка становить 1000 мл. Об'ективно: Загальний стан роділлі середньої важкості, роділля занепокоєна своїм станом. Пульс 100 уд/хв слабкого наповнення та напруження, АТ 100/50 мм. рт. ст. Дихання - 20/хв, блідість шкірних покривів, холодний піт. Через передню черевну стінку пальпуються м'яка матка, яка не реагує на зовнішній масаж та на в/в введення окситоцину.

Із пологових шляхів виділяється кров із згортками. Кров згортается швидко, протягом перших 3-х хвилин.

Час згортання крові по Лі-Уайту 3 хвилини 30 секунд.

Ваш попередній діагноз. Лікувальна тактика. Роль акушерки.

### Задача 25.

У роділлі із надмірною пологовою діяльністю у кінці І періоду пологів після відходження навколооплідних вод з'явились скарги на різкий біль за грудиною, задишка, кашель, страх.

Об'єктивно: шкірні покриви бліді, АТ 90/40 мм. рт. ст., пульс – 106 уд/хв, слабкого наповнення та напруження.

Внутрішнє акушерське дослідження: відкриття маткового вічка повне, голівка на тазовому дні.

Ваш попередній діагноз. Лікувальна тактика. Роль акушерки.

### Задача 26.

На приймальне віddлення поступила повторновагітна із скаргами на перейми, які тривають протягом останніх двох годин та на відходження навколооплідних вод 1 годину тому.

Об'єктивно. Зовнішнє акушерське дослідження: в дні матки пальпуються велика щільна округла частина, яка балотує, над площиною входу в малий таз пальпуються велика, м'яка частина плода без чітких контурів. Справа пальпуються спинка плода, яка повернута до переду. Перейми регулярні по 35-40 сек. через 2,5-3 хв.

Внутрішнє акушерське дослідження: відкриття маткового вічка 5 см, плідний міхур відсутній. Пальпуються м'яка, об'ємна частина, сідничні горби, щілина між сідницями, анус та п'яткова кістка.

Ваш попередній діагноз. Акушерська тактика.

### Задача 27.

На позачерговий прийом в ЖК звернулась першовагітна, 35-36 тижні зі скаргами на ниючий переймоподібний біль внизу живота протягом останньої доби.

При об'єктивному обстеженні окружність живота 92 см. Висота стояння дна матки 36 см (на один поперечний палець нижче мечоподібного відростка). Пальпаторно матка збудлива. Прийомами Леопольда-Левицького визначаються 3 крупних частини плода. Під час аускультації виявлено дві точки ясного серцебиття плода, між ними зонатиші. Різниця у частоті серцевих скорочень становить 10 уд/хв.

За даними УЗД – у матці два плоди, перший плід знаходитьться у головному передлежанні, другий у тазовому.

Ваш попередній діагноз. Акушерська тактика.

### Задача 28.

У гінекологічне віddлення госпіталізовано повторновагітну, 10-11 тижнів, зі скаргами на інтенсивний переймоподібний біль внизу живота, значні кров'янисті відслідження зі статевих шляхів.

Об'єктивно: загальний стан середньої важкості, шкірні покриви бліді, чисті. АТ – 100/60 мм. рт. ст., пульс – 98 уд/хв.

При огляді в дзеркалах: велика кількість кров'янистих виділень,

Піхвове дослідження: шийка матки вкорочена, цервікальний канал відкритий на 2 см (пропускає палець). Матка м'яка, збільшена як на 7-8 тижнів вагітності.

Ваш попередній діагноз. Акушерська тактика.

### Задача 29.

У жіночу консультацію звернулась першовагітна, 15-16 тижнів. Зі скаргами на незначний тягнучий біль внизу живота, крижах протягом останньої доби.

Об'єктивно: загальний стан задовільний, шкірні покриви блідо-рожеві, чисті. АТ – 120/70 мм. рт. ст., пульс – 78 уд/хв. Дно матки на 6 см вище лона (посередині між пупком та симфізом). Пальпаторно матка в тонусі.

При огляді в дзеркалах: шийка матки чиста, виділення звичайні білі.

Піхвове дослідження: шийка матки сформована, рухома, цервікальний канал закритий. Матка збільшена як на 16 тижнів вагітності, тонус матки підвищений. Склепіння піхви вільні. Мис не досягається.

Ваш попередній діагноз. Акушерська тактика.

### Задача 30.

На приймальне віddлення поступила повторновагітна, 32-33 тижні вагітності, зі скаргами нерегулярний переймоподібний біль внизу живота, який триває протягом останніх 2-х годин. Навколооплідні води відійшли 1 годину тому.

Зовнішнє акушерське дослідження. Матка в тонусі. Регулярна пологова діяльність відсутня. Положення плода поздовжнє, передлежить голівка. Спинка плода справа, допереду. Серцебиття плода звучне, ритмічне, 140 уд/хв.

Внутрішнє акушерське дослідження. Піхва жінки, що народжувала. Шийка матки вкорочена до 2,5 см, зовнішнє вічко шийки матки відкрите на 1 см. Виділення водянисті.

Ваш попередній діагноз. Акушерська тактика.

### Задача 31.

У відділення патології вагітних 18 серпня поступила першовагітна К., 20 р. Положення плода поздовжнє, I позиція, передній вид, передлежить голівка, притиснена до входу в малий таз. Серцебиття плода – 160 за хвилину, ритмічне, приглушене. Навколоплідні води цілі. Термін пологів за даними останньої менструації – 2 серпня, за першими рухами плода – 30 липня, за даними жіночої консультації та УЗД – 3 серпня.

Ваш попередній діагноз. Акушерська тактика.

### Задача 32.

Першовагітна 25 років. Вагітність 39 тиж. Розміри таза 23-26-28-20. Перейми тривають протягом 6 год. Навколоплідні води відійшли 1 год. тому.

Об'єктивно: Пологова діяльність активна, регулярна, перейми тривають по 35-40 сек. через 2-3 хв. Положення плода поздовжнє, передлежить голівка малим сегментом у вході в малий таз. Серцебиття плода 140 уд/хв.

Внутрішнє акушерське обстеження. Відкриття маткового вічка 8 см. Плодовий міхур відсутній. Передлежить голівка в площині входу в малий таз. Лобний шов у прямому розмірі, перенісся обернене до переду, передній кут великого тім'ячка – до заду. Мис не досягається.

Через 2 год. пологова діяльність ослабла, перейми по 20-25 сек. через 4-5 хв. Серцебиття плода 170 уд/хв.  
Ваш попередній діагноз. Акушерська тактика.

### Задача 33.

Ви акушерка ФАПу. Вас викликали до першовагітної 22 років. Термін вагітності 38-39 тиж.

Роділля скаржиться на часті та сильні перейми протягом останніх 3 год. У жінки виникає бажання потужитись. Навколоплідні води відійшли 1 год тому.

Об'єктивно. Матка витягнута у поздовжньому напрямі. Пологова діяльність регулярна, надмірна, перейми тривають по 55-60 сек. через 1-1,5 хв. Контракційне кільце розташоване вище лона на 5 п/п. Голівка повністю опустилась в порожнину малого тазу, і при зовнішньому дослідженні не пальпується. При проведенні дослідження по Піскачеку голівка легко досягається. Серцебиття плода вислуховується нижче пупка. Під час перейм 110 уд/хв, в паузах вирівнюється до 130 уд/хв.

Ваш попередній діагноз. Акушерська тактика.