



Геморагічний шок. ДВЗ-синдром. Емболія навколоплідними водами

1. Акушерка пологового відділення проводить внутрішньовенне капілярне введення розчинів. Які розчини відносяться до групи сольових кристалоїдів?

- A. Рінгера
- B. Желатиноль
- C. Реополіглюкін
- D. Гемодез
- E. Поліглюкін

2. Акушерка пологового залу відмічає у роділлі раптову остуду, ціаноз обличчя, біль за грудниною, задишку, тахікардію, АТ- 80/60 мм рт.ст. Попередній діагноз?

- A. Емболія навколоплідними водами
- B. Гіпотонічна кровотеча
- C. Еклампсія
- D. Передчасне відшарування плаценти
- E. Септичний шок

3. Вагітність 34 тижні. Передчасне відшарування плаценти. Жінка перебуває в коматозному стані. Крововтрата біля 2-х літрів. Визначте тактику:

- A. Кесарів розтин
- B. Визвати пологову діяльність
- C. Кесарів розтин, інфузійно-трансфузійна терапія
- D. Інфузійно-трансфузійна терапія
- E. Плродоруйнівна операція

4. Вагітна з надмірною пологовою діяльністю та цілими навколоплодовими водами поскаржилася на різкий біль у грудях, почуття страху, озноб. Об'єктивно: шкірні покриви білі, задишка, шумне дихання, ЧСС - 112/хв, артеріальний тиск - 85/55 мм.рт.ст. Встановіть діагноз.

- А. Емболія навколоплодовими водами
- В. Розрив матки
- С. Передлежання плаценти
- Д. Гіпотонія матки
- Е. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти

5. Вагітній виконано кесарський розтин у зв'язку з передчасним відшаруванням плаценти. Крововтрата - 1,8 л. Відмічається виділення рідкої крові, що не згортається, генералізована кровоточивість зон ін'єкцій, операційного поля. Встановіть діагноз.

- А. Емболія навколо плодовими водами
- В. Геморагічний шок І ступеня
- С. Тромбофлебіт тазових вен
- Д. Нормальний післяопераційний стан
- Е. ДВЗ - синдром

6. Яка кровотеча вважається масивною?

- А. Понад 1% маси тіла
- В. До 0,5% маси тіла
- С. Понад 1,5% маси тіла
- Д. 1,0% - 1,5% маси тіла
- Е. 0,5% - 1,0% маси тіла

7. На ФАП з села доставлена жінка у стані геморагічного шоку другого ступеню тяжкості. Яку невідкладну допомогу надасть акушерка?

- А. В/в введення гелофузину, Рінгер-лактату
- В. В/м введення аміназину
- С. Переливання крові
- Д. В/в введення плазми
- Е. В/в введення глюкози і аскорбінової кислоти

8. У роділлі з бурхливою родовою діяльністю несподівано з'явилися ознаки дихальної недостатності, температура тіла підвищилася до 41 С, став катастрофічно падати артеріальний тиск. Незабаром розвинулася клініка набряку легень. Яке ускладнення виникло у роділлі?

- A. Септичний шок.
- B. Анафілактичний шок.
- C. Внутрішня кровотеча.
- D. Емболія навколоплідними водами.
- E. Еклампсія.

9. Акушерка веде самостійно пологи. Визначаючи характер пологової діяльності діагностувала надмірну пологову діяльність. Які дії вона застосовує для профілактики емболії навколоплодовими водами?

- A. Піднімає головний кінець ліжка
- B. Продовжує спостерігати за станом роділлі
- C. Вводить спазмолітики
- D. Завчасно розтинає плодовий міхур
- E. Робить піхвове дослідження для з'ясування акушерської ситуації

10. Акушерка пологового відділення визначила у роділлі крововтрату 1000 мл, АТ 90/70 мм рт.ст., пульс 120/хв, блідість, холодний піт, олігурія. Попередній діагноз?

- A. Геморагічний шок III ступінь
- B. Геморагічний шок I ступінь
- C. Геморагічний шок II ступінь
- D. Емболія навколоплідними водами
- E. Геморагічний шок IV ступінь

11. Акушерка відділення реанімації визначає шоківий індекс. Вкажіть шоківий індекс, що відповідає найбільш тяжкому стану:

- A. 1
- B. 2
- C. 0,8
- D. 0,5
- E. 1,5

12. У відділенні патології пологового будинку у вагітної, яка лежить на спині, раптово виникла блідість шкірних покривів, липкий піт, знизився АТ, стало утрудненим дихання. Яка причина цього стану?

- A. Синдром стиснення нижньої порожнистої вени
- B. Розрив матки
- C. Емболія навколоплідними водами
- D. Відшарування плаценти
- E. Геморагічний шок

13. Після гемотрансфузії обов'язковим аналізом є:

- A. Посів сечі
- B. Аналіз крові на цукор
- C. Загальний аналіз сечі
- D. Посів крові
- E. Аналіз сечі на ацетон

14. Акушерку викликали до роділлі у якої підвищилась температура до 39 С, біль в молочній залозі. Акушерка без перевірки на чутливість увела в/м пеніцилін, у жінки виник шум у вухах, холодний піт, шкірний свербіж, ціаноз. Що треба зробити передусім:

- A. ввести серцеві препарати
- B. ШВЛ
- C. непрямий масаж серця
- D. місце введення обробити адреналіном 0,1%
- E. гемодез

15. Породіллі в ранньому післяпологовому періоді з геморагічним шоком перед усім треба:

- A. Ввести знеболюючі
- B. Ввести кальцію хлорид
- C. Ввести преднізолон
- D. Наладити інфузію розчин у дві вени
- E. Ввести кордіамін

16. Породілля, в ранній післяпологовий період, у зв'язку з гіпотонією матки, втратила 1,5 літра крові [1,8%] від маси тіла. Матка періодично розслабляється, кров, що виділяється з пологових шляхів, не згортається. Встановіть попередній діагноз:

- А. ДВЗ-синдром
- В. Гіпотонічна крововтрата. ГШ II ступені. ДВЗ-синдром
- С. Емболія навколоплідними водами
- Д. Геморагічний шок
- Е. Гіпотонічна крововтрата

17. Назвіть препарат, розчин якого протипоказаний до застосування при лікуванні геморагічного шоку:

- А. Стабізол
- В. Глюкоза
- С. Рефортан
- Д. Розчин 0,9% NaCl
- Е. Свіжозаморожена плазма

18. У післяпологовому періоді почалася гіпотонічна маткова кровотеча, проведено ручне відділення плаценти і виділення посліду, масаж матки. Пологові шляхи цілі. Проте, кровотеча триває і через 10 хвилин досягла 1500 мл. Стан роділлі різко погіршився, АТ знизився до 90 / 40 мм.рт.ст., Пульс ниткоподібний, шкірні покриви і слизові оболонки бліді, жінка збуджена, вкрита холодним потом, шоківий індекс = 1.5, ЦВД менше 50 мм.вод.ст. Яку невідкладну допомогу слід надати?

- А. ручне обстеження порожнини матки
- В. холод на низ живота
- С. введення спазмолітиків
- Д. лікування емболії навколоплідними водами
- Е. лікування геморагічного шоку 2 ступеня

**Геморагічний шок. ДВЗ-синдром. Емболія
навколоплідними водами. Відповіді:**

- | | | |
|---------|----------|----------|
| 1) - A; | 7) - A; | 13) - C; |
| 2) - A; | 8) - D; | 14) - D; |
| 3) - C; | 9) - C; | 15) - D; |
| 4) - A; | 10) - C; | 16) - B; |
| 5) - E; | 11) - B; | 17) - B; |
| 6) - C; | 12) - A; | 18) – E. |